

# Développement asymptotique de la série harmonique


On effectue un développement asymptotique à l'ordre 2 de la série harmonique  $\sum \frac{1}{n}$ .

**Lemme 1.** Soit  $\alpha > 1$ . Lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ , on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[I-P]  
p. 380

*Démonstration.* La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_*^+$ , nous allons faire une comparaison série / intégrale.



On a

$$\forall k \geq 1, \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha}$$

D'où :

$$\forall k \geq 2, \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx$$

Soit  $N \geq 2$ . Pour tout  $n \in \llbracket 2, N \rrbracket$ ,

$$\begin{aligned} \int_n^{N+1} \frac{1}{x^\alpha} dx &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{n-1}^N \frac{1}{x^\alpha} dx \\ \Leftrightarrow \left[ \frac{-1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right]_n^{N+1} &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \left[ \frac{-1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right]_{n-1}^N \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(N+1)^{\alpha-1}} \right) &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{N^{\alpha-1}} \right) \end{aligned}$$

La suite  $\left( \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \right)$  est donc convergente, car elle est croissante et majorée par  $\frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \right)$ . Lorsque  $N$  tend vers  $+\infty$ , on a donc


$$\frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \right)$$

Or, comme  $n^{\alpha-1} \sim (n-1)^{\alpha-1}$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , on en conclut l'équivalent annoncé.  $\square$

**Théorème 2** (Développement asymptotique de la série harmonique). On note  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ . Alors, quand  $n$  tend vers  $+\infty$ ,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

*Démonstration.* La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_*^+$ , cela invite à faire une comparaison série / intégrale.



On a

$$\forall k \geq 1, \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$$

Traisons les deux morceaux séparément.

—  $\forall k \geq 1, \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$  par l'inégalité de droite. Donc, en sommant entre 1 et  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq H_n$$

—  $\forall k \geq 2, \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx$  par l'inégalité de gauche avec un changement de variable. Donc, en sommant entre 2 et  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln(n)$$

et en ajoutant 1 :

$$H_n \leq \ln(n) + 1$$

On peut tout regrouper pour obtenir les inégalités suivantes :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

et donc, quand  $n$  tend vers  $+\infty$ ,

$$H_n \sim \ln(n)$$

Pour la suite, on pose pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = H_n - \ln(n)$  et pour tout  $n \geq 2$ ,  $v_n = H_{n-1} - \ln(n)$ . On a :

—  $\forall n \geq 2, u_n - v_n = \frac{1}{n} \geq 0$  et converge vers 0 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

—  $\forall n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} u_n - u_{n+1} &= -\frac{1}{n+1} - \ln(n) + \ln(n+1) \\ &= -\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

car  $\ln(1+x) \leq x$  pour  $x \in ]-1, +\infty[$ .

—  $\forall n \geq 2$ ,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{n} + \ln(n) - \ln(n+1) \\ &= \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes, elles convergent donc vers un réel  $\gamma \in \mathbb{R}$ . Posons maintenant

$$\forall n \geq 1, t_n = u_n - \gamma = H_n - \ln(n) - \gamma$$

Nous allons utiliser le lien entre séries et suites : cherchons un équivalente de la suite  $(t_n - t_{n-1})$  pour obtenir un équivalent de la somme partielle de la série de terme général  $(t_n - t_{n-1})$  qui n'est autre que la suite  $(t_n)$ . À l'aide du développement limité de  $\ln(1+x)$  en 0 on obtient

$$\begin{aligned} t_n - t_{n-1} &= \ln(n-1) - \ln(n) + \frac{1}{n} \\ &= \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \\ &\sim -\frac{1}{2n^2} \end{aligned}$$

D'après le critère de Riemann, la série de terme général  $t_k - t_{k-1}$  converge. Le théorème de sommation des équivalents donne l'équivalence des restes. Or, un équivalent du reste de la série de Riemann  $\sum \frac{1}{n^2}$  est donné par le Lemme 1 et vaut  $\frac{1}{n}$  :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} t_k - t_{k-1} = -t_n \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} -\frac{1}{2k^2} \sim -\frac{1}{2n}$$

D'où  $t_n \sim \frac{1}{2n}$  et  $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ . On pose alors  $\forall n \geq 1, w_n = t_n - \frac{1}{2n}$  et on procède de

manière similaire pour obtenir, pour tout  $n \geq 2$  :

$$\begin{aligned}
 w_n - w_{n-1} &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n} \\
 &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n} \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= -\frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)
 \end{aligned}$$

On a donc

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} w_k - w_{k-1} = -w_n \sim \frac{1}{2} \frac{1}{6n^2} = \frac{1}{12n^2}$$

d'où le résultat. □

# Bibliographie

**L'oral à l'agrégation de mathématiques**

**[I-P]**

Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*. 2<sup>e</sup> éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.